

การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดทำ สารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย Health Promotion & Environmental Health FACT SHEET

นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

จำนวนรายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ รายคลัสเตอร์

คลัสเตอร์	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สตรีและเด็กปฐมวัย	12	12	25	49	50
วัยเรียนวัยรุ่น	12	12	21	28	53
วัยทำงาน	1	2	6	15	32
ผู้สูงอายุ	2	2	4	5	23
อนามัยสิ่งแวดล้อม	3	4	5	6	13
รวม	30	32	61	103	<u>171</u>

สถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ จำแนกตามความถี่

คลัสเตอร์	ทุกเดือน	3 เดือน	6 เดือน	ปีละครั้ง	2 ปีครั้ง
สตรีและเด็กปฐมวัย	27	17	0	6	0
วัยเรียนวัยรุ่น	1	7	16	26	3
วัยทำงาน	0	0	23	9	0
ผู้สูงอายุ	0	0	3	20	0
อนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	3	10	0
รวม	<u>28</u>	<u>24</u>	<u>45</u>	<u>71</u>	<u>3</u>

ที่มา : คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน	ปี 2564	ขาดการตั้งค่าเป้าหมาย
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	19	4
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	26	-
สำนักทันตสาธารณสุข	20	-
สำนักโภชนาการ	64	33
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	11	3
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	1	-
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	17	-
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	2	-
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	5	-
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	6	5
รวม	<u>171</u>	<u>45</u>

ที่มา : คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
จำแนกราย Cluster (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย	ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	21.8	19.9	22.5	22.9	39.8
2. อัตราตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR)	ไม่เกิน 3.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	4.5/1000	4.6/1000	4.5/1000	4.2/1000	4.7/1000
3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์	ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับการฝากครรภ์	53.77	58.42	70.15	75.00	73.8
4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์	ร้อยละ 75	66.71	70.86	80.28	87.24	81.5
5. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	51.8	53.34	65.04	68.49	71.01
6. อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	-	8.1/1000	7.2/1000	6.9/1000	6.2/1000	6.8/1000
7. ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	ไม่เกินร้อยละ 7	NA	10.7	9.9	9.5	9.8

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
8. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ร้อยละ 90	81.2	83.6	89.4	90.2	88.4
9. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	ร้อยละ 80	83.6	78.8	74.4	73.4	72.3
10. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ร้อยละ 20	16.4	21.2	25.6	26.6	27.7
11. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตาม	ร้อยละ 90	78.0	86.1	92.3	93.2	92.5
12. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ร้อยละ 85	98.0	98.4	98.6	98.9	99.0
13. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง)	ร้อยละ 85	77.9	80.7	87.1	88.1	86.2

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
14. ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ	ตรวจช่องปาก ร้อยละ 30	78.4	18.6	19.0	19.3	17.7
	และ ปราศจากฟันผุร้อยละ 95	94.9	94.9	95.4	95.9	96.2
15. ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ	ร้อยละ 65	58.8	59.6	61.8	57.8	53.0
16. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	ร้อยละ 95		96.7	94.3	98.7	95.6
17. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ	ปราศจากฟันผุร้อยละ 73		66.6	69.8	72.2	73.7
18. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ตรวจช่องปาก ร้อยละ 50		34.6	36.4	35.4	33.4
19. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก	ได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก ร้อยละ 75				17.8	15.4

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
20. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง	ไม่เกินร้อยละ 14	16.44	16.06	16.43	15.05	14.71
21. ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 20	ไม่เกินร้อยละ 25	-	-	-	24.72	19.65
22. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำ เสริมธาตุเหล็ก	ร้อยละ 80	-	25.98	47.28	62.27	68.95
23. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก	ร้อยละ 100	77.10	70.52	75.90	79.50	80.06
24. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ 62	49.86	51.67	58.6	63.7	62.6
25. เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/ หญิง (ชม.)	ปี 2565 ผู้ชาย 113 เซนติเมตร ผู้หญิง 112 เซนติเมตร	109.8/ 109.2	109.3/ 108.7	108.7/ 108.0	109.1/ 108.5	108.8/ 108.3
26. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	ร้อยละ 9.5	3.2	3.2	10.8	9.3	8.8
27. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย	ร้อยละ 12	9.7	10.1	15.8	10.5	10.6
28. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม	ร้อยละ 5.5	5.6	5.1	6.4	5.5	5.5

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง						
29. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง	ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง	-	-	-	6.61	0.69
30. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง	ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจางได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	-	-	-	3.52	1.27
31. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ		-	-	-	9.62	4.00

หมายเหตุ :: ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน



กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
การเฝ้าระวังการไต่ยีนของนักเรียน						
32. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการไต่ยีน	ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1	-	-	-	2.91	0.46
33. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการไต่ยีนผิดปกติ	ได้รับการตรวจคัดกรองการไต่ยีน	-	-	-	2.18	1.50
34. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการไต่ยีนผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ		-	-	-	1.38	1.35
การเฝ้าระวังภาวะสายต่านักเรียน						
35. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา	ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1	-	-	-	3.19	0.59
36. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ	ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา	-	-	-	4.03	0.30
37. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา		-	-	-	14.27	90

หมายเหตุ :: ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ



กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
38. ร้อยละของเด็ก ป.1 -ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ 60	-	-	-	-	11.9
39. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free)	ตรวจช่องปาก ร้อยละ 60	-	42.2	42.8	48.7	40.0
	และ ปราศจากฟันผุร้อยละ 71	60.7	69.8	70.0	71.0	70.2
40. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)	ตรวจช่องปาก ร้อยละ 60	-	42.2	42.8	48.7	40.0
	และ ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 82	71.8	82.0	83.4	83.4	80.6
41. ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกระดับชั้น	ร้อยละ 100	95.1	86.5	60.2	89.4	81.3
42. ร้อยละของโรงเรียนปลอดอาหารเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	ร้อยละ 90	-	8.61	29.1	25.5	41.2
43. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์	ร้อยละ 90	-	-	-	52.3	39.3

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
44. ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้	ร้อยละ 50	-	-	-	25.4	11.5
45. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2)	ร้อยละ 55	-	46.0	55.4	31.8	34.3
46. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน	ร้อยละ 40	-	18.4	-	20.7	20.0

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
47. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	$\geq$ ร้อยละ 50	-	-	21.7	33.45	23.53
48. ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี	ปี 2565 ผู้ชาย 154 เซนติเมตร ผู้หญิง 155 เซนติเมตร	ช 147.1 ญ 148.5	ช 148.6 ญ 149.9	ช 147.7 ญ 148.9	ช 148.7 ญ 149.8	ช 147.6 ญ 148.7
49. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	$\geq$ ร้อยละ 66	65.2	65.5	61.5	65.7	59.6*
50. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	$\leq$ ร้อยละ 10	11.1	11.7	13.6	12.5	11.0
51. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม	$\leq$ ร้อยละ 5	5.0	4.7	5.1	4.4	3.7
52. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย	$\leq$ ร้อยละ 5	5.1	5.5	8.9	6.0	9.7
53. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน	$\geq$ ร้อยละ 66	-	-	-	61.5	61.3
54. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	$\leq$ ร้อยละ 10	-	-	-	17.1	13.3
55. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะผอม	$\leq$ ร้อยละ 5	-	-	-	2.2	1.6
56. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย	$\leq$ ร้อยละ 5	-	-	-	10.8	8.6

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

หมายเหตุ * : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปีบริบูรณ์ใน HDC ซึ่งสะท้อนการเจริญเติบโตในปัจจุบัน จึงทำให้ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ลดลงจาก 65.7(ปี63) เป็น 59.6 (ปี64)

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
57. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)	$\leq$ 27/พัน	-	35.33	28.57	29.01	26.20 (ไตรมาส 3)
58. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted)	$\leq$ 1.0/พัน	-	1.24	1.02	0.94	1.05 (ไตรมาส 3)
59. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	$\leq$ ร้อยละ 13.5	17.03	16.04	14.94	14.42	13.91 (ณ 16 ส.ค. 64)
60. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้ง (จำแนกรายวิธี 7 วิธี)	ยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	-	-	-	-	27.01 (ณ 16 ส.ค. 64)
61. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง	$\geq$ ร้อยละ 80	-	30.03	35.34	40.01	40.45 (ณ 16 ส.ค. 64)

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
62. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	$\geq$ ร้อยละ 80	-	66.39	65.86	68.62	65.96 (ณ 16 ส.ค. 64)
63. ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	ร้อยละ 66	-	-	62.90	50.30	ผลการดำเนินงานปี 2564 ผลออกเดือน พฤศจิกายน 2564
64. ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป	ไม่เกิน 13 ชั่วโมงต่อวัน	-	-	13.47	14.32	
65. ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	ร้อยละ 31	-	-	24.40	17.10	

กลุ่มวัยทำงาน

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
66. ร้อยละประชาชนอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ 30	-	-	20.8	35.2	44.5
67. ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที	ร้อยละ 65	-	-	55.6	63.2	70.8
68. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน	≥ ร้อยละ 50	67.83	64.73	59.22	59.89	61.47
69. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	ปี 64 ร้อยละ 50 ปี 65 ร้อยละ 51	-	-	48.29	48.41	48.02

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

หมายเหตุ * : อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบข้อมูลของผู้จัดการระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข และจะกำหนดเป้าหมายในปี 2565

กลุ่มวัยทำงาน

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
70. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ท็อปพี ทุกวัน 1. ประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมการกินที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50	50	-	-	17.79	44.5	49.22
71. ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ท็อปพี ทุกวัน 1. ประชากรวัยทำงานอายุ 25 - 59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมการกินที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50 2. ความครอบคลุมของข้อมูลพฤติกรรมการกินที่พึงประสงค์ของวัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี ร้อยละ 30	50	-	-	N/A	46.37	50.48
72. ร้อยละประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	ร้อยละ 71	-	-	74.60	54.70	กกส

หมายเหตุ * : อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบข้อมูลของผู้จัดการระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข และจะกำหนดเป้าหมายในปี 2565

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
73. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ	ร้อยละ 70	66.6	65.6	67.6	67.8	68.8
74. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน	ร้อยละ 77	75	76.1	72.1	66.8	67.12
75. ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ 30	-	-	-	-	27.4
76. ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการปกติ	ร้อยละ 47	-	-	-	46.46	45.99
77. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ 50	-	54.4	50.0	37.8	30.8
78. ร้อยละประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	ร้อยละ 71	-	-	73.4	52.9	กกส

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

หมายเหตุ * : อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบข้อมูลของผู้จัดการระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข และจะกำหนดเป้าหมายในปี 2565

กลุ่มอนามัยและสิ่งแวดล้อม

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
79. ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนประเภทต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย	ร้อยละ 55	-	40.1	40.7	39.8	32 (ณ 18 ตุลาคม 2564)
80. ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	ร้อยละ 40	-	-	-	-	25.1 (ณ 18 ตุลาคม 2564)
81. ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1001 - 1003)	ร้อยละ 70	-	61.84	66.54	57.58	71.43